

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΜΔΚΦ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΟΗ 5ml/h ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 48h ΜΕΣΩ PORT CATH

- 1) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ
- 2) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250ML ΕΩΣ 300 ML ΕΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 5 ML/H
- 3) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΕΣ, ΑΘΟΥΡΥΒΕΣ, ΦΟΡΗΤΕΣ , ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Η' ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ.
- 4) ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΑΜΤΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΤΣΑΚΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ
- 5) ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
- 6) ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
- 7) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
- 8) ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (FLUOROURACIL)
- 9) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΡΟΗΣ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ (5FU) ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ
- 10) ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.
- 11) ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΡΟΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 5 % ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
- 12) ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΚΜΔΚΦ

ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΟΣ Μ.Π.Π.Ν.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΡΟΝΑΔΩΣ
ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ